

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

09.10.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Амокси ВЛ 80

(Организация-разработчик: ООО «Ветлайн», 117405, г. Москва, ул. Дорожная,
д. 60 «Б», 1 этаж, офис №7).

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-17.20-4702 N17BP-3-17.20/0358

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Амокси ВЛ 80
(Амоху VL 80).

Международное непатентованное наименование: амоксициллин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Амокси ВЛ 80 содержит в 1 г в качестве действующего вещества 800 мг амоксициллина тригидрата, в качестве вспомогательных веществ: карбонат натрия безводный, цитрат натрия и аэросил (кремния диоксид коллоидный).

3. Лекарственный препарат представляет собой порошок белого или слегка желтоватого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.

Срок годности лекарственного препарата после первого вскрытия упаковки составляет 3 месяца.

Срок годности раствора препарата в питьевой воде – 12 часов при температуре не выше 25°C.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Амокси ВЛ 80 расфасовывают по 1 кг и 5 кг в полимерные ведра с закрытыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждая единица потребительской упаковки сопровождается инструкцией по применению.

5. Амокси ВЛ 80 хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользуемый препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Амокси ВЛ 80 отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Амокси ВЛ 80 относится к антибактериальным препаратам группы пенициллинов.

10. Амоксициллина тригидрат, входящий в состав лекарственного препарата, является полусинтетическим антибиотиком пенициллинового ряда и обладает широким спектром действия. Представляет собой 4-гидроксильный аналог ампициллина. Оказывает бактерицидное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli.*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Clostridium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*, *Proteus mirabilis*, *Leptospira spp.*, *Moraxella spp.*, *Actinobacillus spp.*

К амоксициллину устойчивы микроорганизмы, продуцирующие пенициллиназу.

Механизм действия антибиотика заключается в нарушении синтеза мукопептида, входящего в состав клеточной стенки микроорганизмов, путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

Амоксициллина тригидрат после орального применения хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и быстро распределяется в организме. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 1,5-2 часа и удерживается на терапевтическом уровне не менее 12 часов после применения. Выводится антибиотик из организма преимущественно с мочой.

По степени воздействия на организм Амокси ВЛ 80 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Амокси ВЛ 80 порошок для орального применения назначают свиньям и сельскохозяйственным птицам с лечебной целью при острых и хронических заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы, желудочно-кишечного

тракта и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата и антибиотикам пенициллинового ряда.

Амокси ВЛ 80 запрещается применять курам несушкам, яйца которых будут использоваться в пищевых целях, и ремонтному молодняку кур менее, чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением препарата в яйцах, а также животным с выраженной почечной и печеночной недостаточностью.

13. При применении препарата необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного применения. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки и лицо с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к амоксициллину тригидрату, а также к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Амокси ВЛ 80.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки глаз его необходимо смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакции и/или случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться к врачу (при себе иметь инструкцию по применению и этикетку).

14. Возможность использования Амокси ВЛ 80 в период беременности и лактации определяется ветеринарным врачом на основании оценки соотношения ожидаемой пользы к возможному риску от применения препарата.

15. Амокси ВЛ 80, порошок для орального применения, применяют животным перорально индивидуально и групповым способом в течение 3-5 дней в следующих дозах:

свиньям и сельскохозяйственной птице с водой для поения в дозе 250 г на 1000 л воды (10-20 мг амоксициллина на 1 кг массы животного). Лечебный раствор в период лечения готовят ежедневно.

При групповом способе применения в период лечения свиньи и птицы должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Необходимо убедиться, что препарат полностью растворен в воде. Максимальная растворимость препарата составляет 8 г на литр при температуре 20 °С. При снижении температуры воды растворимость препарата также снижается.

16. При применении Амокси ВЛ 80 в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные лекарственные средства и симптоматическое лечение.

17. При передозировке препарата у животных могут наблюдаться рвота и диарея.

18. Не следует применять Амокси ВЛ 80 совместно с антибиотиками тетрациклинового ряда, хлорамфениколом, макролидами и линкозамидами, ввиду возможного снижения его бактериальной активности.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в одной и той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток, птиц - не ранее, чем через 4 суток после последнего применения Амокси ВЛ 80.

Мясо животных вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «Ветлайн», 142132,
Московская обл., Г.о. Подольск,
поселок Дубровицы, ФГБНУ ФНЦ
ВИЖ им. Л.К. Эрнста, здание
центра трансплантации
эмбрионов, 1 этаж, пом. 10-15, 39-
47, 49, 53.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «Ветлайн», 117405, г.
Москва, ул. Дорожная, д. 60 «Б»,
1 этаж, офис №7.