



ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Докси ВЛ 50

(Организация-разработчик: ООО «Ветлайн», 117405, г. Москва, ул. Дорожная,
д.60 «Б», 1 этаж, офис № 7.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-8.21-4759 № ПВР-3-8.21/03640

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Докси ВЛ 50 (Doxy VL 50).

Международное непатентованное наименование: доксициклин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Докси ВЛ 50 содержит в 1 г в качестве действующего вещества 500 мг доксициклина гиклата, в качестве вспомогательного вещества – винную кислоту.

3. Лекарственный препарат представляет собой порошок от светло-желтого до желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.

Срок годности лекарственного препарата после первого вскрытия упаковки составляет 9 месяцев.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечению срока годности.

4. Докси ВЛ 50 расфасовывают по 100 г, 1 кг и 5 кг в полимерные ведра, укупоренные пластмассовыми крышками, с контролем первого вскрытия.

Каждая единица потребительской упаковки сопровождается инструкцией по применению.

5. Докси ВЛ 50 хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользуемый препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Докси ВЛ 50 отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Докси ВЛ 50 относится к антибиотикам тетрациклинового ряда.

10. Препарат обладает широким спектром антибактериального действия; активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Clostridium perfringens*, *Chlamydia* spp., *Rickettsiae* spp., *Escherichia coli*., *Staphylococcus* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Streptococcus* spp., *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Mycoplasma* spp.

Механизм бактериостатического действия доксициклина заключается в нарушении синтеза белка микробной клетки, что препятствует делению и формированию клеточной стенки. Доксициклина гиклат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и быстро распределяется в организме. Максимальная концентрация антибиотика в сыворотке крови достигается через 2-4 часа и удерживается на терапевтическом уровне не менее 18-20 часов после применения Докси ВЛ 50. Выводится антибиотик из организма в виде неактивных метаболитов преимущественно с фекалиями.

По степени воздействия на организм Докси ВЛ 50 относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

В рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гепатотоксическим действием.

III. Порядок применения

11. Докси ВЛ 50 назначают свиньям и сельскохозяйственным птицам с лечебной целью при острых и хронических заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам лекарственного препарата и антибиотикам тетрациклинового ряда.

Докси ВЛ 50 запрещается применять животным с выраженной почечной и печеночной недостаточностью. Запрещается применение препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением доксициклина в яйцах.

13. При применении препарата необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного применения. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки и лицо с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к тетрациклинам, а также к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Докси ВЛ 50.

При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть проточной водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакции и/или случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться к врачу (при себе иметь инструкцию по применению и этикетку).

14. Запрещается применять препарат супоросным и лактирующим свиноматкам, а также ремонтному молодняку кур старше 16 недельного возраста. При применении препарата молодняку в период роста зубов возможно изменение цвета зубной эмали.

15. Докси ВЛ 50, порошок для орального применения, применяют животным перорально индивидуально или групповым способом в следующих дозах:

- свиньям с водой для поения в дозе 100 г на 1000 л питьевой воды (12,5 мг доксициклина гиклата на 1 кг массы животного). Лечебный раствор в период лечения готовят ежедневно. Продолжительность лечения составляет 4-8 дней.

- сельскохозяйственной птице с водой для поения в дозе 100 г на 1000 л питьевой воды (10-20 мг доксициклина гиклата на 1 кг массы животного). В случае высокой чувствительности микроорганизмов (МИК до 1 мкг/мл) применяется препарат в дозе 10 мг/кг доксициклина гиклата, если чувствительность средняя (МИК до 2 мкг/мл) применяется дозировка 20 мг/кг доксициклина гиклата на 1 кг массы животного. Лечебный раствор в период лечения готовят ежедневно. Продолжительность лечения составляет 3-4 дня.

При групповом способе применения свиньи и птица должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

16. При применении Докси ВЛ 50 в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у свиней и птиц, как правило не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к тетрациклинам и возникновения аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные лекарственные средства и симптоматическую терапию.

17. Симптомы передозировки лекарственного препарата для ветеринарного применения не выявлены.

18. Докси ВЛ 50 запрещается применять с другими антибиотиками цефалоспориновой и пенициллиновой групп, а также с минеральными добавками и лекарственными препаратами, содержащие соли кальция, магния,

железа и алюминия, ввиду возможного снижения его антибактериальной активности.

Не следует смешивать Докси ВЛ 50 с другими препаратами и кормовыми добавками.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в одной и той же дозировке и по той же схеме.

21. Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 4 дня; птиц – не ранее чем через 3 дня после последнего применения препарата в дозе 10 мг/кг и 8 дней после применения в дозе 20 мг/кг доксициклина гиклата на 1 кг массы животного.

Мясо животных и птицы вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного препарата
для ветеринарного применения.

ООО «Ветлайн», 142132,
Московская обл., г.о. Подольск,
поселок Дубровицы, ФГБНУ ФНЦ
ВИЖ им. Л.К. Эрнста, здание
центра трансплантации эмбрионов,
1 этаж, пом. 10-15, 39-47, 49, 53.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

ООО «Ветлайн», 117405, г.
Москва, ул. Дорожная, д. 60 «Б»,
1 этаж, офис № 7.

Управляющий - Индивидуальный
предприниматель ООО «Ветлайн»

Насибов Н.Н.

