



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «МК-АГРОТОРГ»
By: Булгакова Т. Н.
«__» 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «ДЕЗОМИГ ANTISEPT» для дезинфекции поверхностей объектов ветеринарного надзора с целью профилактики инфекционных болезней животных, в том числе птицы.

Организация - производитель: ООО «МК-АГРОТОРГ», Москва.

I. Общие сведения

1.1. ДЕЗОМИГ ANTISEPT – дезинфицирующее средство, предназначено для дезинфекции поверхностей объектов ветеринарного надзора с целью профилактики инфекционных болезней животных, в том числе птицы.

1.2. В 1 мл ДЕЗОМИГ ANTISEPT содержится в качестве действующего вещества изопропиловый спирт до 700 мг, четвертичные аммониевые соединения 5 мг и вспомогательное вещество: вода до 1 мл.

1.3. Средство ДЕЗОМИГ ANTISEPT представляет собой готовый к применению раствор.

1.4. По внешнему виду средство ДЕЗОМИГ ANTISEPT представляет собой жидкость светло желтого цвета со специфическим запахом.

1.5. ДЕЗОМИГ ANTISEPT представлен в объемах 0.1, 0.5, 1, 5 и 20 л и упакован в полиэтиленовые канистры соответствующей вместимости с навинчивающимися крышками-контролем первого вскрытия.

Каждую единицу фасовки маркируют и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от минус 30 °С до плюс 30 °С. Срок годности в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения – 3 года, со дня изготовления.

Транспортируют ДЕЗОМИГ ANTISEPT всеми видами транспорта в оригинальной упаковке производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

1.6. ДЕЗОМИГ ANTISEPT хранить в местах, недоступных для детей.

1.7. Не применять по истечении срока годности.

1.8. Неиспользуемое дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности, а также пустую упаковку из-под него, утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Биологические свойства

2.1. ДЕЗОМИГ ANTISEPT эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи, плесень, грибов рода кандида).

2.2. ДЕЗОМИГ ANTISEPT по степени воздействия на организм относится к мало опасным веществам при введении в желудок и нанесение на кожу (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). Не оказывает местно-раздражающего действия на кожу при однократном воздействии, при повторных вызывает сухость кожи, при попадании в глаза вызывает раздражение; не обладает сенсибилизирующим действием, не взаимодействует с материалами обрабатываемых поверхностей. При ингаляционном воздействии вызывает раздражение органов дыхания и глаз, сонливость, головокружение.

III. Порядок применения

3.1. Средство предназначено для дезинфекции поверхностей объектов ветеринарного надзора с целью профилактики инфекционных болезней животных, в том числе птицы, а также зооантропонозных вирусных заболеваний общих для животных и человека, включая:

- производственные помещения, бытовые помещения, технологическое оборудование и территорию предприятий биологической и перерабатывающей промышленности (птицеперерабатывающей, мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей и молочной), пищевой промышленности, а также тару.

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения, находящиеся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты (включая инкубатории, яйцесклады), молочные блоки и кормокухни, санитарно-техническое оборудование, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару;

- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный), используемые для перевозки животных и птиц, а также сырья и продукции животного происхождения;

- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

Средство не разбавлять. В работе использовать предварительно очищенные поверхности.

3.2. Обработка поверхностей.

Поверхности обрабатывают в направлении от более чистых зон к более грязным, двигаясь сверху вниз, от дальних зон к ближним.

Поверхность равномерно орошают средством и распределяют по плоскости специально сложенными салфетками краями внутрь, салфетки не должны оставлять ворсинки на объекте.

Обработку вертикальных поверхностей проводят в направлении сверху вниз, а горизонтальных с края поверхности к середине, протирая прямыми линиями с наложением 15-30%. Норма расхода при однократной обработке средством 30-40 мл/м².

3.3. ДЕЗОМИГ ANTISEPT не применяется в присутствии животных, в том числе птиц.

3.4. Допускается проведение локальной дезинфекции отдельных свободных от животных стойл, клеток, единиц оборудования и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствия людей, животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

3.5. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г). В качестве нейтрализатора используют воду.

IV. Меры личной профилактики.

4.1. При работе с ДЕЗОМИГ ANTISEPT следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с дезинфицирующими средствами. Не допускать контакта со слизистыми и глазами. Обеззараживание поверхностей способом протирания и орошения следует проводить с зашитой органов дыхания (универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «А», глаз (герметичные очки), кожи рук (перчатки резиновые). Обеспечить вентиляцию обрабатываемых помещений.

4.2. К работе с ДЕЗОМИГ ANTISEPT не допускаются лица моложе 18 лет или страдающие аллергическими заболеваниями и чувствительные к компонентам средства, имеющими противопоказания для работы с дезинфицирующими средствами, не прошедшие инструктаж по работе с дезинфицирующими средствами.

4.3. При попадании ДЕЗОМИГ ANTISEPT в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии пораженную зону промакивают 30%-м раствором сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.4. При проглатывании средства прополоскать рот, не пить, рвоту не вызывать. Немедленно обратиться к врачу.

4.5. При появлении раздражения верхних дыхательных путей вывести пострадавшего на свежий воздух или в другое проветриваемое помещение, прополоскать носоглотку водой. Обратиться к врачу.

Инструкция разработана организацией-производителем: ООО «МК-АГРОТОРГ», 127081, г. Москва, ул. Полярная, д. 7, корп. 2, эт. 1, пом. 1, комн. 35.