

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МК-АГРОТОРГ»

А. В. Королев

«04» мая 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ 05/21

по применению ДЕЗОМИГАIR WINS для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных

(производства: ООО «МК-АГРОТОРГ», г. Москва)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ДЕЗОМИГАIR WINS – дезинфицирующее средство в форме аэрозоля для дезинфекции объектов ветеринарного надзора с целью профилактики и инфекционных болезней животных.

ДЕЗОМИГАIR WINS в своем составе содержит изопропиловый спирт – 70 мл, алкилдиметилбензиламмония хлорид – 0,15 мл, глутаровый альдегид – 0,15 мл, полигексаметиленгуанидин – 0,05 мл, стабилизаторы и вода подготовленная.

ДЕЗОМИГАIR WINS представляет собой прозрачную жидкость до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом.

Выпускают ДЕЗОМИГАIR WINS расфасованным по 270 мл, 500 мл и 1000 мл в аэрозольных баллонах.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации - производителя, ее адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объёма и упаковки, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности и снабжают инструкцией по применению.

Хранят ДЕЗОМИГАIR WINS в закрытой упаковке производителя в тёмном, сухом месте при температуре от 4° С до 35° С.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения 3 года со дня изготовления.

ДЕЗОМИГАIR WINS по истечении срока годности не должен применяться.

Транспортируют ДЕЗОМИГАIR WINS всеми видами транспорта в таре фирмы-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ДЕЗОМИГАIR WINS обладает широким спектром действия в отношении возбудителей болезней животных и птицы первой, второй и третьей групп устойчивости:

- патогенные микроорганизмы (кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, бруцеллы, клостридии, сальмонеллы, микобактерии туберкулеза, орнитобактерии, гемофильные бактерии и актинобациллы, спорообразующие микроорганизмы и др.);

- вирусы (включая вирусы гриппа птиц H5N1, инфекционной анемии цыплят, болезни Ауески, инфекционного бурсита кур, инфекционного энцефаломиелита птиц и реовирусной инфекции птиц, вирус болезни Марека, вирус ньюкаслской

болезни, вирус ящура, цирковирусной инфекции свиней, респираторно-репродуктивного синдрома свиней, вирусы чумы всех видов животных, в том числе вирусы классической и африканской чумы свиней и др.);

- грибы (включая грибы родов Кандида, Трихофитон, Аспергиллус, дрожжи, плесени и др.);

ДЕЗОМИГАIR WINS по степени воздействия на организм средство относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1,007-76).

ДЕЗОМИГАIR WINS не обладает коррозионной активностью, не портит материалы обрабатываемых поверхностей.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

ДЕЗОМИГАIR WINS применяют для проведения дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- особенно в труднодоступных местах (кормовые бункера, вентиляционные трубы, внутренние помещения силосных башен)

- животноводческие, птицеводческие, свиноводческие и звероводческие помещения, находящееся, в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты (включая инкубатории, яйцесклады), молочные блоки и кормокухни, санитарно-техническое оборудование, санитарные бойни, тару и спецодежду;

- производственные помещения, технологическое оборудование, предприятий биологической, перерабатывающей, пищевой, промышленности, а так же тару и спецодежду.

- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения);

- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

ДЕЗОМИГАIR WINS применяется в отсутствие животных, птиц и людей. Легко наноситься распылением. Приводится в действие нажатием клапана разряда, после чего баллон полностью разряжается. Экспозиция 2-3 часа.

Нормы расхода:

Аэрозольный баллон 270 мл – на 200-300 м³;

Аэрозольный баллон 500 мл – на 300-500 м³;

Аэрозольный баллон 1000 мл – на 700-1000 м³.

После применения не нужно обмывать водой. Проветрить помещения перед вводом животных и птиц.

Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г.).

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Все виды работы с ДЕЗОМИГАIR WINS проводят с использованием средств индивидуальной защиты (защитный костюм, резиновые перчатки, головной убор, респиратор типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и защитные очки).

При проведении всех работ следует соблюдать правила личной гигиены, запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы лицо и руки моют теплой водой с мылом, рот прополоскать.

При проведении любых работ следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

При попадании средства в глаза — промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при раздражении закапать 20% раствор сульфацила натрия, обратиться к врачу.

При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 15-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению дезинфицирующего средства
ДЕЗОМИГАIR WINS разработана «ООО «МК-АГРОТОРГ»

ТУ 20.20.14.000-012-40620103-2021

Производитель: ООО «МК-АГРОТОРГ» Юридический адрес г. Москва, ул. Полярная, д. 7, корп. 2, эт. 1, пом. 1, комн. 35

Адрес производства: г. Энгельс, пр-т Строителей 45 г.

