



веществ корма, что ведет к повышению сохранности и продуктивности свиней, телят и сельскохозяйственной птицы.

### III. Порядок применения

7. ЭНТЕРАЦИД применяют для снижения уровня патогенной микрофлоры в воде для поения и кормах и повышения продуктивности и сохранности свиней, телят и сельскохозяйственной птицы.

8. Добавку вводят в корма, используя существующие технологии ступенчатого смешивания; или в воду для поения автодозаторами или вручную. Нормы ввода в воду определяют методом подтитровки с учетом ее жесткости.

Нормы ввода составляют:

Вид животного	В воду	В корм
Бройлерам	0.25-1 л/т воды	0.5-2 л/т корма
Курам-несушкам	0.25-1 л/т воды	0.5-1.5 л/т корма
Подсосным пороссятам	1.5-4 л/т воды	1.5-4 л/т корма
Пороссятам отъёмышам	1-3 л/т воды	1-3.5 л/т корма
Пороссятам на дорацивании	0.75-2.5 л/т воды	1-3 л/т корма
Свиньям на откорме	0.5-2 л/т воды	1-2.5 л/т корма
Свиноматкам	1.5-2.5 л/т воды	2-3 л/т корма
Телятам	0.25-1.5 л/т воды	0.25-1л/т корма

9. ЭНТЕРАЦИД применяется для заготовки силоса и сенажа из подвяленной массы однолетних и многолетних трав, кукурузы с влажностью 50-75%, для предотвращения самонагревания зеленой массы трав на корм, для консервирования плющеного зерна высокой влажности.

Нормы ввода составляют:

Применение	Дозировка в литрах на тонну консервируемой массы
Злаковые травы	4,0
Злаково-бобовые травосмеси	4,5
Бобовые	5,0
Кукуруза	4,0
Плющенное зерно	3,0-4,0
Предотвращение самовозгорания зеленой массы	2,5-3,0

10. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

11. ЭНТЕРАЦИД совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

12. Продукцию животноводства после применения ЭНТЕРАЦИД можно использовать в пищевых целях без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

13. При работе с добавкой ЭНТЕРАЦИД следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Не допускать контакта добавки с кожей и глазами. Применять защитную одежду, перчатки ПВХ, защитные очки, защитную маску или респиратор. Обеспечить

вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

14. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с ней. При попадании добавки на кожу – промыть водой с мылом; в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды (не менее 15 минут); при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При любом несчастном случае обратиться к врачу, при себе иметь инструкцию по применению или этикетку продукта.

15. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: ООО «МК-АГРОТОРГ», 127081, г. Москва, ул. Полярная, д. 7, корп. 2, эт.1, пом. 1, комн. 35

Наименование и адрес организации-производителя: ООО «МК-АГРОТОРГ», 413116 Россия, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д. 45г.